

Beruhigung**Information für Patientinnen und Patienten**

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen. Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten, oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäß Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, Apothekerin oder Drogistin an, um den größten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Wann wird SIMILASAN Beruhigung angewendet?

Gemäß homöopathischem Arzneimittelbild kann SIMILASAN Beruhigung angewendet werden bei:

- Innerer Unruhe mit Herzschlägen
- Innerer Unruhe mit Verkrampfungen im Verdauungstrakt (Magen-Darm-Krämpfe, nervös bedingte Verstopfung)
- Nervösen Verdauungsbeschwerden wie Rülpsen, Magendruck, Blähungen
- Nervösen Schlafstörungen, allgemeiner Gereiztheit und Verspannung

Was sollte dazu beachtet werden?

- Das Präparat kann sowohl über längere Zeit hinweg (bei chronischer Unruhe und Verkrampftheit) als auch sporadisch (bei ab und zu auftretenden Beschwerden) eingenommen werden.
- Bei Anhalten der Beschwerden über einen Monat soll ärztliche Hilfe beansprucht werden.
- Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob SIMILASAN Beruhigung gleichzeitig eingenommen werden darf.

Wann darf SIMILASAN Beruhigung nicht oder nur mit Vorsicht eingenommen werden?

- Für Kleinkinder nur auf ärztliche Verordnung anwenden.
- Die Tropfen enthalten 60 Vol.% Alkohol.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie an andern Krankheiten leiden, Allergien haben oder andere Arzneimittel (auch selbstgekauft) einnehmen.

Darf SIMILASAN Beruhigung während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?

Auf Grund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit - auch wegen des enthaltenen Alkohols - möglichst auf Medikamente verzichten oder Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie SIMILASAN Beruhigung?

Falls vom Arzt bzw. von der Ärztin nicht anders verschrieben:

Kinder ab 2 Jahren: 5 Tropfen in Wasser verdünnt (enthalt Alkohol).

Jugendliche: 7 Tropfen / Erwachsene: 10 Tropfen

- Akute Beschwerden (starke Unruhe): Halbstündlich. Mit zunehmender Besserung weniger häufig.
- Zum Ausheilen: 3 x täglich.
- Nervöse Schlafstörungen: 3 x täglich (regelmässig auf den Tag verteilt) und zusätzlich ½ Stunde vor dem Zubettgehen.

Einnahmehinweise:

- Tropfen direkt auf die Zunge geben oder mit sehr wenig Wasser verdünnt einnehmen. Für Kinder stets verdünnen.
- Mit der Zunge auf die umliegenden Schleimhäute verteilen.
- Dürfen auch auf nüchternen Magen eingenommen werden.

Die Wirkungsdauer einer Arzneimittelpille kann individuell verschieden sein. Grundsätzlich wird die Einnahme des Präparates bei Nachlassen der Wirkung oder bei Rückkehr der Beschwerden wiederholt. Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn bei der Behandlung eines Kleinkindes/Kindes die gewünschte Besserung nicht eintritt, ist mit ihm ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirkt zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann SIMILASAN Beruhigung haben?

Für SIMILASAN Beruhigung sind bisher bei bestimmungsgemässem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden.

Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen beobachten, informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung).

Massnahmen bei anfänglicher Symptomverstärkung:

1. Präparat nicht mehr einnehmen bis die Reaktion abgeklungen ist.
2. Einmal 10 Tropfen (Jugendliche 7 Tropfen, Kinder 5 Tropfen) einnehmen. Wirkung abwarten.
3. Bei Wiederholung der Reaktion gleiches Verhalten wie unter 1. und 2. beschrieben.
4. Wird keine Reaktion mehr verspürt, die Empfehlungen unter "Wie verwenden Sie ..." einhalten.

Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie SIMILASAN Beruhigung ab und informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist ferner zu beachten?

- Das Präparat SIMILASAN Beruhigung ist auch alkoholfrei erhältlich. Bevorzugen Sie für Jugendliche und Kinder das alkoholfreie Präparat.
- Vor Kindern geschützt aufbewahren.
- Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit <Exp.> bezeichneten Datum verwendet werden.
- Bei Raumtemperatur (15 - 25 °C) lagern.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist in SIMILASAN Beruhigung enthalten?

Asa foetida D4 / Crataegus D4 / Lycopus virginicus D3 / Passiflora incarnata D4 zu gleichen Teilen.

Enthält 60 Vol.% Alkohol.

Zulassungsnummer:

46306 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie SIMILASAN Beruhigung?**Welche Packungen sind erhältlich?**

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

Packungsgröße: 50 ml

Zulassungsinhaberin:

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Diese Packungsbeilage wurde im September 2003 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

Calmant des nerfs**Information destinée aux patients**

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par le pharmacien ou le droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications du médecin, pharmacien ou droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Quand SIMILASAN calmant des nerfs est-il utilisé?

Conformément au schéma thérapeutique homéopathique SIMILASAN calmant des nerfs peut être utilisé en cas de:

- Agitation interne avec palpitations
- Agitation interne avec crampes de l'appareil digestif (estomac et intestin, constipation d'origine nerveuse)
- Troubles digestifs d'origine nerveuse tels que renvois, pesanteur d'estomac, ballonnements
- Troubles du sommeil d'origine nerveuse, irritabilité et tension permanente

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

- La préparation peut tout aussi bien être prise durant une période prolongée (dans les cas d'agitation et de crispation chroniques) que ponctuellement (en cas de troubles sporadiques).
- Si les troubles persistent plus d'un mois, vous devez consulter votre médecin.
- Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou votre pharmacien si SIMILASAN calmant des nerfs peut être pris simultanément.

Quand SIMILASAN calmant des nerfs ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

- Ne pas administrer aux jeunes enfants sans demander l'avis de votre médecin.
- Les gouttes contiennent 60 % vol. d'alcool. Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez d'une autre maladie, vous êtes allergique, vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication).

SIMILASAN calmant des nerfs peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement - également en raison de l'alcool qu'ils peuvent contenir - ou demander l'avavis du médecin, du pharmacien ou du droguiste.

Comment utiliser SIMILASAN calmant des nerfs ?

Sauf prescription contraire du médecin:

Enfants à partir de 2 ans: 5 gouttes diluées dans de l'eau (contient de l'alcool).

Adolescents: 7 gouttes / Adultes: 10 gouttes

- Troubles aigus (agitation excessive): Toutes les demi-heures. Lorsque l'amélioration se fait sentir, diminuer la fréquence.
- Pour parachever la guérison: 3 fois par jour.
- Troubles du sommeil d'origine nerveuse: 3 fois par jour (réglièrement réparti sur la journée) et, en sus, ½ h avant le coucher.

Mode d'emploi:

- Mettre les gouttes directement sur la langue ou les prendre diluées dans très peu d'eau. Pour les enfants, toujours diluer dans de l'eau.
- Répartir avec la langue sur les muqueuses avoisinantes.
- Les gouttes peuvent être prises même si vous êtes à jeun.

Le temps d'action d'un médicament peut varier d'une personne à l'autre. C'est pourquoi il est conseillé d'administrer une nouvelle prise lorsque l'effet de la préparation diminue ou lorsque les troubles reviennent.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si l'amélioration escomptée de l'enfant en bas âge / de l'enfant ne se produit pas, faites-le examiner par un médecin. Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou droguiste si vous estimatez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires SIMILASAN calmant des nerfs peut-il provoquer?

L'emploi approprié du médicament n'a donné lieu à aucun effet secondaire attesté à ce jour.

Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale).

Mesures en cas d'aggravation des symptômes au début du traitement:

1. Suspendre l'administration de la préparation jusqu'à ce que la réaction thérapeutique ait cessé.
2. Prendre 10 gouttes (adolescents 7 gouttes, enfants 5 gouttes) en une fois. Attendre l'effet.
3. Si la réaction se répète, agir comme indiqué sous points 1. et 2.
4. Si vous ne ressentez aucune réaction, respectez les recommandations mentionnées sous "Comment utiliser ...".

Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec SIMILASAN calmant des nerfs et informez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

A quoi faut-il encore faire attention?

- Le médicament SIMILASAN calmant des nerfs existe également dans une version sans alcool. Pour les adolescents et les enfants prendre de préférence le médicament sans alcool.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <Exp.> sur le récipient.
- Conserver à température ambiante entre 15 et 25 °C.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient SIMILASAN calmant des nerfs ?

Asa foetida D4 / Crataegus D4 / Lycopus virginicus D3 / Passiflora incarnata D4 à parts égales.

Contient 60 % vol. d'alcool.

Numéro d'autorisation:

46306 (Swissmedic)

Où obtenez-vous SIMILASAN calmant des nerfs ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie et en drogerie, sans ordonnance médicale.

Conditionnement: 50 ml

Titulaire de l'autorisation:

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Cette notice d'emballage a été contrôlée par l'Autorité des médicaments (Swissmedic) en septembre 2003.

Calmante**Informazione destinata ai pazienti**

Legga attentamente questo prospetto, perché contiene informazioni importanti. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente dal suo medico oppure è stato da lei acquistato in farmacia o drogheria senza ricetta medica. Per ottenere il massimo giovamento da questo preparato, lo utilizzi come descritto nel prospetto interno ovvero attenendosi alle istruzioni che ha ricevuto dal medico, farmacista o dal droghiere. Abbia cura di conservare il prospetto del medicamento, perché eventualmente lo vorrà leggere ancora in un secondo tempo.

Quando si usa SIMILASAN calmante ?

Secondo i principi farmacologici dell'omeopatia, SIMILASAN calmante trova impiego nei casi di:

- Irrequietezza con tachicardia
- Irrequietezza con spasmi nel canale digestivo (spasmi gastro-intestinali, stitichezza di origine nervosa)
- Disturbi digestivi di origine nervosa come eruttazione, oppressione gastrica, flatulenza
- Disturbi del sonno, irritabilità e tensione

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

- Il preparato può essere utilizzato per periodi prolungati (in caso di irrequietezza cronica e spasmi) o sporadicamente (in caso di disturbi occasionali).
- Se i disturbi persistono per oltre un mese, bisogna rivolgersi a un medico.
- Qualora siano stati prescritti altri medicinali da parte del medico curante, consultare il medico o il farmacista per sapere se è possibile assumere contemporaneamente anche SIMILASAN calmante.

Quando non si può assumere SIMILASAN calmante e quando la sua somministrazione richiede prudenza ?

- Il preparato non deve essere utilizzato per i bambini piccoli, se non su prescrizione del medico.
- Le gocce contengono alcol al 60 Vol.%.

Informi il suo medico, farmacista o droghiere se soffre di altre malattie, ha qualche allergia oppure, prende altri medicamenti (anche se acquistati di propria iniziativa).

Si può assumere SIMILASAN calmante durante la gravidanza o l'allattamento?

Con un uso conforme del preparato, in base alle esperienze fatte finora non si conoscono rischi per il bambino. Peraltra non sono mai stati effettuati studi scientifici sistematici. Durante la gravidanza e l'allattamento si consiglia di evitare, per precauzione, il più possibile l'uso di medicinale - anche a motivo del contenuto alcolico - e comunque di rivolgersi per un consiglio al proprio medico curante, al farmacista o al droghiere.

Come usare SIMILASAN calmante ?

Salvo diversa prescrizione medica, attenersi alla seguente posologia:

Bambini oltre due anni: 5 gocce diluite in acqua (contiene alcol).

Ragazzi: 7 gocce / Adulti: 10 gocce

- Disturbi acuti (forte irrequietezza): Ogni mezz'ora. Diminuire la frequenza non appena sopraggiunge un miglioramento.
- Come cura di consolidamento: 3 volte al giorno.
- Disturbi del sonno di origine nervosa: 3 volte al giorno (ad intervalli regolari) e ½ ora prima di andare a letto.

Avvertenze per l'assunzione:

- Versare le gocce direttamente sulla lingua o somministrarle diluendole in pochissima acqua. Per i bambini vanno sempre diluite.
- Distribuire il liquido con la lingua alle mucose circostanti.
- Può essere somministrato anche a stomaco vuoto.

La durata dell'effetto varia a seconda del soggetto. In generale si consiglia di ripetere la somministrazione del preparato in caso di riduzione dell'effetto o di ripresa dei sintomi.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico.

Se il trattamento riguarda un bambino e non si ottiene il miglioramento desiderato, il bambino deve essere visitato da un medico.

Se ritiene che il medicamento agisca troppo o troppo poco, ne parli al medico, al farmacista o al droghiere.

Quali effetti collaterali può avere SIMILASAN calmante ?

Non sono stati finora osservati effetti collaterali in seguito all'impiego corretto di SIMILASAN calmante. Se comunque osserva dei effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico, farmacista o droghiere. L'assunzione di preparati omeopatici può dar luogo a una temporanea intensificazione dei sintomi (peggioramento iniziale).

Cosa fare quando i sintomi si acutizzano:

1. Interrompere la somministrazione fino a quando la reazione si affievolisce.
2. Prendere in una volta sola 10 gocce (giovani 7 gocce, bambini 5 gocce) e aspettare l'effetto.
3. Se la reazione si ripete, comportarsi come descritto ai punti 1. e 2.
4. Se non si avverte più alcuna reazione, attenersi alle raccomandazioni descritte al paragrafo "Come usare ...".

Qualora il peggioramento dovesse persistere, interrompere l'assunzione di SIMILASAN calmante e consultare il medico, il farmacista o il droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

- Il medicamento SIMILASAN calmante è disponibile anche in versione senza alcol. Nel caso di bambini e ragazzi è preferibile usare il medicamento senza alcol.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Il preparato può essere somministrato solo fino alla data <Exp.> indicata sulla confezione.
- Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Ulteriori informazioni possono essere fornite dal medico, dal farmacista o dal droghiere.

Cosa contiene SIMILASAN calmante ?

Asa foetida D4 / Crataegus D4 / Lycopus virginicus D3 / Passiflora incarnata D4 in parti uguali. Contiene alcol al 60 Vol.-%.

Numeri dell'omologazione:

46306 (Swissmedic)

Dov'è ottenibile SIMILASAN calmante ?**Quali confezioni sono disponibili ?**

In farmacia e drogheria, senza prescrizione medica. Confezione: 50 ml

Titolare dell'omologazione:

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Questo foglio illustrativo è stato controllato per l'ultima volta nel settembre 2003 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

Sedation**Information for patients**

Read this package leaflet carefully since it contains important information. This medicine has either been prescribed for you personally by your doctor, or you have purchased it from a pharmacist or druggist without a medical prescription. In order to obtain the greatest benefit from this medicine, use it according to this package leaflet or as directed by your doctor, pharmacist or druggist. Keep this package leaflet safe, you may want to read it again later.

When should SIMILASAN sedation be taken?

In accordance with homeopathic principles,

SIMILASAN sedation can be taken in cases of:

- Inner tension with palpitations
- Inner tension with gastro-intestinal cramps and nervous constipation
- Nervous digestive disorders, such as belching, flatulence, and a pressure sensation in the stomach
- Nervous sleeplessness, general irritability and tension

What precautions should be taken?

• It is safe to take on a long-term basis for chronic tension and restlessness, and sporadically for occasional symptoms.

• If the problem persists for more than one month you should obtain medical help.

• If your physician has prescribed other medications, please ask him/her or your pharmacist if you may take SIMILASAN sedation at the same time.

When must SIMILASAN sedation not be used or used only with caution?

• To be taken by small children only if prescribed by a doctor.

• The drops contain 60 vol.% alcohol.

Tell your doctor, pharmacist or druggist if you are suffering from any other diseases or illnesses, have allergies or are taking other medicines (even those you have bought yourself).

May SIMILASAN sedation be taken during pregnancy or while breast-feeding?

Experience so far shows that there is no known risk to the unborn child when used as recommended.

However, systematic scientific studies have never been performed. As a precautionary measure, you are advised to refrain from taking medications during pregnancy and while breast-feeding - especially if they contain alcohol - or to consult your physician, pharmacist or druggist.

How do you take SIMILASAN sedation ?

Unless prescribed differently by your physician:

Children older than 2 years of age: 5 drops diluted in water (contains alcohol)

Adolescents: 7 drops / Adults: 10 drops

- Acute phase (severe restlessness): Take at half-hourly intervals, less frequently as the symptoms improve.
- During resolution: Take 3 times daily.
- Nervous sleeplessness: Three times daily, spread evenly over the day, and half an hour before going to bed.

Instructions for use:

- Place the drops directly on your tongue, or take diluted with very little water. Always dilute for children.

- Use your tongue to spread the medication over the mucous membranes of your mouth.

- The preparation may also be taken on an empty stomach.

The period of effectiveness of a medical preparation can vary from person to person. As a rule, repeat the dose when the effect wears off or the symptoms recur.

Keep to the dosage given in the package leaflet or prescribed by your doctor. If no improvement is seen in a young child/child, seek the advice of a doctor. If you think that the medicine is working too little or too strongly, talk to your doctor, pharmacist or druggist.

What side effects can SIMILASAN sedation have?

No incidents of side effects have been reported for

SIMILASAN sedation provided the correct dosage is adhered to and the precautionary measures are observed.

However, please inform your doctor, pharmacist or druggist if you should notice any side effect. When using homeopathic medication, the symptoms may at first become more pronounced for a short period (initial exacerbation).

Measures to take in the case of initial worsening of symptoms:

1. Stop taking the preparation until the reaction has ceased.

2. Take a single dose of 10 drops (adolescents: 7 drops, young children: 5 drops) and wait for reaction.

3. If the reaction recurs, proceed as described in 1. and 2. above.

4. If the reaction does not recur, follow the instructions mentioned in "How do you take ...".

Should the worsening of symptoms persist, stop taking SIMILASAN sedation and inform your physician, pharmacist or druggist.

What should also be taken into consideration?

- This medication SIMILASAN sedation is also available in alcohol-free form. The alcohol-free form is preferable for children and adolescents.

- Keep out of the reach of children.

- This preparation must not be used after the expiry date indicated as <Exp.> on the container.

- Store at room temperature (15-25 °C).

Further information can be obtained from your physician, pharmacist or druggist.

What does SIMILASAN sedation contain?

Asa foetida D4 / Crataegus D4 / Lycopus virginicus D3 / Passiflora incarnata D4 in equal proportions.

Contains 60 vol.% alcohol.

Product licence No.:

46306 (Swissmedic)

Where can you obtain SIMILASAN sedation ?**How is the preparation presented?**

In pharmacies and drugstores, without medical prescription.

Package size: 50 ml

Holder of the product licence:

Similasan AG, CH-8916 Jonen

The latest examination of this package leaflet was carried out in September 2003 by the Federal Authorities for Medication (Swissmedic).