

Pomata**Informazione destinata ai pazienti**

Legga attentamente questo prospetto, perché contiene informazioni importanti. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente dal suo medico oppure è stato da lei acquistato in farmacia o drogheria senza ricetta medica. Per ottenere il massimo giovamento da questo preparato, lo utilizzi come descritto nel prospetto interno ovvero attenendosi alle istruzioni che ha ricevuto dal medico, farmacista o dal droghiere. Abbia cura di conservare il prospetto del medicamento, perché eventualmente lo vorrà leggere ancora in un secondo tempo.

Quando si usa SIMILASAN Calendula ?

Secondo i principi farmacologici dell'omeopatia, SIMILASAN Calendula trova impiego nei casi di:

- Ferite infiammabili e di lenta guarigione (ferite che si rimarginano molto lentamente)
- Ferite fresche, dolenti (scalpiture, lacerazioni, tagli, bruciature e contusioni)
- Pelle screpolata e aperta sulle mani
- Cicatrici dolenti e infiammabili, cicatrizzazione molto lenta

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

- Le ferite estese, molto contaminate e profonde, come anche i morsi e le ferite da punta richiedono un trattamento medico (pericolo di tetano). Rivolgersi, inoltre, al medico se le dimensioni della ferita tendono a non ridursi o se la ferita non si rimarginia nel giro di 7 giorni. Lo stesso vale se i margini della ferita sono molto arrossati, o la ferita comincia improvvisamente a gonfiarsi e a far molto male o se compare febbre (pericolo di settemberia).
- Qualora siano stati prescritti altri medicinali da parte del medico curante, consultare il medico o il farmacista per sapere se è possibile usare contemporaneamente anche SIMILASAN Calendula.

Quando non si può usare SIMILASAN Calendula e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

- Le ustioni estese devono essere immediatamente trattate da un medico.

- Non usare in caso di ipersensibilità nota alle composite (arnica, calendula ecc.).
- Informi il suo medico, farmacista o droghiere se
 - soffre di altre malattie,
 - ha qualche allergia oppure,
 - prende o applica esternamente (anche se acquistati di propria iniziativa) altri medicamenti.

Come usare SIMILASAN Calendula ?

Salvo diversa prescrizione medica, attenersi alla seguente posologia:

- Prima dell'uso della pomata pulire bene la ferita.
- Spalmare la pomata su una compressa (usare compresse sterili) e applicarla sulla ferita oppure spalmare uno strato sottile di pomata direttamente sui punti colpiti.
- Disturbi acuti: Applicare più volte al giorno, secondo le necessità. Sostituire la compressa almeno 2 volte al giorno.
- Per la completa guarigione: 2-3 volte al giorno fino a sparizione dei sintomi. Sostituire la compressa almeno una volta al giorno.

La durata dell'effetto varia a seconda del soggetto. In generale si consiglia di ripetere la somministrazione del preparato in caso di riduzione dell'effetto o di ripresa dei sintomi. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento riguarda un bambino e non si ottiene il miglioramento desiderato, il bambino deve essere visitato da un medico.

Se ritiene che il medicamento agisca troppo o troppo poco, ne parli al medico, al farmacista o al droghiere.

Quali effetti collaterali può avere SIMILASAN Calendula ?

In rari casi possono comparire reazioni di ipersensibilità (allergia) alle composite. Se notasse degli effetti collaterali che non sono descritti in questo prospetto, dovrebbe informare il suo medico, suo farmacista o suo droghiere. L'uso di preparati omeopatici può dar luogo a una temporanea intensificazione dei sintomi (peggioramento iniziale).

Cosa fare quando i sintomi si acutizzano:

1. Interrompere la somministrazione della pomata fino a quando la reazione si affievolisce.
2. Spalmare uno strato sottile sulle parti interessate. Aspettare la reazione.
3. Se la reazione si ripete, comportarsi come descritto ai punti 1. e 2.
4. Se non si avverte più alcuna reazione, attenersi alle raccomandazioni descritte al paragrafo "Come usare ...".

Qualora il peggioramento dovesse persistere, interrompere l'assunzione di SIMILASAN Calendula e consultare il medico, il farmacista o il droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

- Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).
- Dopo l'uso chiudere bene il tubo.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Il preparato può essere somministrato solo fino alla data <Exp.> indicata sulla confezione.

Ulteriori informazioni possono essere fornite dal medico, dal farmacista o dal droghiere.

Cosa contiene SIMILASAN Calendula ?

1 g di pomata contiene: Calendula officinalis D4 / D6 / D12 in parti uguali 33,3 mg nella base della pomata con olio di arachidi idrogenato, glicole propilenico, alcool cetilico, polysorbato 60, acqua. Conservante: complesso di sodio e cloruro d'argento.

Numero dell'omologazione:

54135 (Swissmedic)

Dov'è ottenibile SIMILASAN Calendula ?**Quali confezioni sono disponibili?**

In farmacia e drogheria, senza ricetta medica.

Confezione: Tubo da 50 g di contenuto

Titolare dell'autorizzazione:

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Questo foglio illustrativo è stato controllato per l'ultima volta nel settembre 2003 dall'autorità competente in materia di medicamenti (Swissmedic).

Ointment**Information for patients**

Read this package leaflet carefully since it contains important information. This medicine has either been prescribed for you personally by your doctor, or you have purchased it from a pharmacist or druggist without a medical prescription. In order to obtain the greatest benefit from this medicine, use it according to this package leaflet or as directed by your doctor, pharmacist or druggist. Keep this package leaflet safe, you may want to read it again later.

When should SIMILASAN Calendula be used?

In accordance with homeopathic principles, SIMILASAN Calendula can be used in cases of:

- Inflamed wounds which are slow to heal (the wound does not close rapidly)
- Fresh, painful wounds (abrasions, lacerations, cuts, burns and bruises)
- Chapped, cracked skin on the hands
- Inflamed, painful scars, slow scar formation

What precautions should be taken?

- Extensive, severely contaminated and deep surface wounds, puncture wounds and wounds caused by bites require medical treatment (danger of tetanus). A physician should also be consulted if the wound area remains unchanged after a certain period of time, or if the wound does not heal within 7 days. This also applies if the wound margin becomes highly reddened, if the wound becomes suddenly swollen or extremely painful, or if the injury is accompanied by fever (danger of blood poisoning).
- If your physician has prescribed other medications, please ask him/her or your pharmacist if you may use SIMILASAN Calendula at the same time.

When must SIMILASAN Calendula not be used or used only with caution?

- Severe and extensive burns must be treated immediately by a physician.

- Do not use in cases of a known sensitivity to composite plants (arnica, calendula, etc.).
- Tell your doctor, pharmacist or druggist if you
 - are suffering from any other diseases or illnesses,
 - have allergies or
 - are taking other medicines (even those you have bought yourself) by mouth or using them externally!

How do you use SIMILASAN Calendula ?

Unless prescribed differently by your physician:

- Cleanse the wound thoroughly before applying the ointment.
- Use the ointment to coat compresses (use sterile wound compresses) applied to the wound, or apply a thin coating of the ointment directly to the affected area of skin.
- In the acute phase: Apply several times a day, according to need. Change compresses at least twice per day.
- During resolution: Apply 2-3 times daily, until the symptoms disappear. Change compresses at least once per day.

The period of effectiveness of a medical preparation can vary from person to person.

As a rule, always begin another course of treatment when the effect wears off or the symptoms recur. Keep to the dosage given in the package leaflet or prescribed by your doctor. If no improvement is seen in a young child/child, seek the advice of a doctor. If you think that the medicine is working too little or too strongly, talk to your doctor, pharmacist or druggist.

What side effects can SIMILASAN Calendula have?

In rare cases, hypersensitive reactions (allergy to composite) can occur. If you notice side effects that are not described here, you should inform your doctor, pharmacist or druggist. When using homeopathic medication, the symptoms may at first become more pronounced for a short period (initial exacerbation).

Measures to take in the case of initial worsening of symptoms:

1. Stop using the ointment until the reaction has ceased.

2. Apply only a thin layer to affected skin areas and wait to observe the reaction.

3. If the reaction recurs, proceed as described in 1. and 2. above.

4. If the reaction does not recur, follow the instructions mentioned in "How do you use ...".

Should the worsening of symptoms persist, stop using SIMILASAN Calendula and inform your physician, pharmacist or druggist.

What should also be taken into consideration?

- Store at room temperature (15-25 °C).
- Close tube properly after use.
- Keep out of the reach of children.
- The medication may only be used until the expiry date marked <Exp.> on the container.

Further information can be obtained from your physician, pharmacist or druggist.

What does SIMILASAN Calendula contain?

1 g of ointment contains: Calendula officinalis D4 / D6 / D12 in equal proportions 33,3 mg in ointment base of hardened peanut oil, propylene glycol, cetyl alcohol, polysorbate 60 and water.

Preservative: Sodium-silver-chloride-complex.

Product licence No.:

54135 (Swissmedic)

Where can you obtain SIMILASAN Calendula ? How is the preparation presented?

In pharmacies and drugstores, without medical prescription.

Package size: Tube containing 50 g

Holder of the product licence:

Similasan AG, CH-8916 Jonen

The latest examination of this package leaflet was carried out in September 2003 by the Federal Authorities for Medication (Swissmedic).