

Milchbildung**Information für Patientinnen und Patienten**

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen. Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten, oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäß Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, Apothekerin oder Drogistin an, um den größten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Wann wird SIMILASAN Milchbildung angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann SIMILASAN Milchbildung angewendet werden bei:

- Milchmangel der Stillenden und zur Förderung des Milchflusses

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob SIMILASAN Milchbildung gleichzeitig eingenommen werden darf.

Wann darf SIMILASAN Milchbildung nicht oder nur mit Vorsicht eingenommen werden?

- Bis heute sind keine Anwendungseinschränkungen bekannt. Bei bestimmungsgemässem Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmassnahmen notwendig.
- Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie
 - an andern Krankheiten leiden,
 - Allergien haben oder
 - andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte) einnehmen.

Wie verwenden Sie SIMILASAN Milchbildung ?

Falls vom Arzt bzw. von der Ärztin nicht anders verschrieben:

Markanter Milchmangel, sehr spärlicher Milchfluss:
6 mal täglich 7 Globuli
Optimierung und Aufrechterhaltung der Milchmenge:
2-3 mal täglich 7 Globuli

Einnahmehinweise:

- Globuli (Kügelchen) im Mund zergehen lassen.
- Dürfen auch auf nüchternen Magen eingenommen werden.

Die Wirkungsdauer einer Arzneimittelgabe kann individuell verschieden sein. Grundsätzlich wird die Anwendung des Präparates bei Nachlassen der Wirkung oder bei Rückkehr der Beschwerden wiederholt. Behandlungsdauer: Bei Bedarf während der ganzen Stillzeit.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung.

Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann SIMILASAN Milchbildung haben?

Für SIMILASAN Milchbildung sind bisher bei bestimmungsgemässem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden.

Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen beobachten, informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung).

Massnahmen bei anfänglicher Symptomverstärkung:

1. Präparat nicht mehr einnehmen bis die Reaktion abgeklungen ist.

Globuli

2. Einmal 7 Globuli (Kügelchen) einnehmen.

Wirkung abwarten.

3. Bei Wiederholung der Reaktion gleiches Verhalten wie unter 1. und 2. beschrieben.

4. Wird keine Reaktion mehr verspürt, die Empfehlungen unter "Wie verwenden Sie ..." einhalten.

Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie SIMILASAN Milchbildung ab und informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist ferner zu beachten?

- Zuckerfrei. Mit Xylit.
- Vor Kindern geschützt aufbewahren.
- Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit <Exp.> bezeichneten Datum verwendet werden.
- Bei Raumtemperatur (15–25 °C) lagern.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist in SIMILASAN Milchbildung enthalten?

Globuli enthalten: Alfalfa D6 / Lac caninum D10 / Urtica urens D6 zu gleichen Teilen.
Das Präparat enthält als Hilfstoffe Xylit und Calciumcarbonat.

Zulassungsnummer:

54925 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie SIMILASAN Milchbildung ?**Welche Packungen sind erhältlich?**

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

Packungsgrössen: 15 g

4,5 g (nur als Bestandteil der Taschen-Apotheke)

Zulassungsinhaberin:

Similasan AG, CH-8916 Jona

Diese Packungsbeilage wurde im Februar 2009 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

Formation du lait maternel**Information destinée aux patients**

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous

y trouverez tous les renseignements importants

concernant le médicament. Ce médicament vous

a été prescrit par votre médecin ou vous a été

remis sans ordonnance par le pharmacien ou

le droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice,

veuillez l'utiliser conformément à la notice

d'emballage ou, le cas échéant, aux indications

du médecin, pharmacien ou droguiste. Conservez

cette notice d'emballage pour pouvoir la relire

plus tard si nécessaire.

Quand SIMILASAN formation du lait maternel est-il utilisé?

Conformément au schéma thérapeutique

homéopathique SIMILASAN formation du lait

maternel peut être utilisé en cas de:

- Manque de lait chez la mère allaitante et pour stimuler la montée du lait

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres

médicaments, demandez à votre médecin ou à

votre pharmacien si SIMILASAN formation du lait

maternel peut être pris simultanément.

Quand SIMILASAN formation du lait maternel ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

- Aucune limitation d'emploi n'est connue à ce

jour. Si le médicament est utilisé conformément

à l'usage auquel il est destiné, aucune

précaution particulière n'est requise.

- Veuillez informer votre médecin, votre

pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie,

- vous êtes allergique,

- vous prenez déjà d'autres médicaments

(même en automédication).

Globules

2. Prendre en une fois 7 globules. Attendre l'effet.

3. Si la réaction se répète, agir comme indiqué sous points 1. et 2.

4. Si vous ne ressentez aucune réaction, respectez les recommandations mentionnées sous „Comment utiliser ...“.

Si cette aggravation persiste, cessez le traitement

avec SIMILASAN formation du lait maternel et informez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

A quoi faut-il encore faire attention?

- Sans sucre. Avec xylite.

- Conserver hors de portée des enfants.

- Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <Exp.> sur le récipient.

- Conserver à température ambiante entre 15 et 25 °C.

Pour de plus amples renseignements, consultez

votre médecin, votre pharmacien ou votre

droguiste.

Que contient SIMILASAN formation du lait maternel ?

Les globules contiennent: Alfalfa D6 / Lac

caninum D10 / Urtica urens D6 à parts égales.

La préparation contient en tant qu'excipients

xylite et carbonate de calcium.

Numéro d'autorisation:

54925 (Swissmedic)

Où obtenez-vous SIMILASAN formation du lait maternel ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance

médicale.

Conditionnements: 15 g

4,5 g (seulement si fait partie de la pharmacie de poche)

Titulaire de l'autorisation:

Similasan AG, CH-8916 Jona

Cette notice d'emballage a été contrôlée par

l'autorité des médicaments (Swissmedic) en

février 2009.

Comment utiliser SIMILASAN formation du lait maternel ?

Sauf prescription contraire du médecin:

Important manque de lait, montée de lait très

tardive:

7 globules 6 fois par jour

Optimisation et maintien de la quantité de lait:

7 globules 2 - 3 fois par jour

Mode d'emploi:

- Laisser fondre les globules dans la bouche.

- Les globules peuvent être pris même si vous êtes à jeun.

Le temps d'action d'un médicament peut varier

d'une personne à l'autre. C'est pourquoi il est

conseillé d'administrer une nouvelle prise lorsque

l'effet de la préparation diminue ou les troubles

reviennent.

Durée du traitement: En cas de besoin pendant

toute la durée de l'allaitement.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la

notice d'emballage ou prescrit par votre médecin.

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien

ou droguiste si vous estimatez que l'efficacité du

médicament est trop faible ou au contraire trop

forte.

Le temps d'action d'un médicament peut varier

d'une personne à l'autre. C'est pourquoi il est

conseillé d'administrer une nouvelle prise lorsque

l'effet de la préparation diminue ou les troubles

reviennent.

Durée du traitement: En cas de besoin pendant

toute la durée de l'allaitement.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la

notice d'emballage ou prescrit par votre médecin.

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien

ou droguiste si vous estimatez que l'efficacité du

médicament est trop faible ou au contraire trop

forte.

Le temps d'action d'un médicament peut varier

d'une personne à l'autre. C'est pourquoi il est

conseillé d'administrer une nouvelle prise lorsque

l'effet de la préparation diminue ou les troubles

reviennent.

Durée du traitement: En cas de besoin pendant

toute la durée de l'allaitement.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la

notice d'emballage ou prescrit par votre médecin.

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien

ou droguiste si vous estimatez que l'efficacité du

médicament est trop faible ou au contraire trop

forte.

Le temps d'action d'un médicament peut varier

d'une personne à l'autre. C'est pourquoi il est

conseillé d'administrer une nouvelle prise lorsque

l'effet de la préparation diminue ou les troubles

reviennent.

Durée du traitement: En cas de besoin pendant

toute la durée de l'allaitement.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la

notice d'emballage ou prescrit par votre médecin.

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien

ou droguiste si vous estimatez que l'efficacité du

médicament est trop faible ou au contraire trop

forte.

Le temps d'action d'un médicament peut varier

d'une personne à l'autre. C'est pourquoi il est

conseillé d'administrer une nouvelle prise lorsque

l'effet de la préparation diminue ou les troubles

reviennent.

Durée du traitement: En cas de besoin pendant

toute la durée de l'allaitement.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la

notice d'emballage ou prescrit par votre médecin.

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien

ou droguiste si vous estimatez que l'efficacité du

médicament est trop faible ou au contraire trop

forte.

Le temps d'action d'un médicament peut varier

d'une personne à l'autre. C'est pourquoi il est

conseillé d'administrer une nouvelle prise lorsque

l'effet de la préparation diminue ou les troubles

reviennent.

Durée du traitement: En cas de besoin pendant

toute la durée de l'allaitement.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la

notice d'emballage ou prescrit par votre médecin.

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien

ou droguiste si vous estimatez que l'efficacité du

médicament est trop faible ou au contraire trop

forte.

Le temps d'action d'un médicament peut varier

d'une personne à l'autre. C'est pourquoi il est

conseillé d'administrer une nouvelle prise lorsque

l'effet de la préparation diminue ou les troubles

reviennent.

Durée du traitement: En cas de besoin pendant

toute la durée de l'allaitement.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la

notice d'emballage ou prescrit par votre médecin.

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien

ou droguiste si vous estimatez que l'efficacité du

médicament est trop faible ou au contraire trop

forte.

Le temps d'action d'un médicament peut varier

d'une personne à l'autre. C'est pourquoi il est

conseillé d'administrer une nouvelle prise lorsque

l'effet de la préparation diminue ou les troubles

reviennent.

Durée du traitement: En cas de besoin pendant

toute la durée de l'allaitement.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la

notice d'emball

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente questo prospetto, perché contiene informazioni importanti. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente dal suo medico oppure è stato da lei acquistato in farmacia o drogheria senza ricetta medica. Per ottenere il massimo giovamento da questo preparato, lo utilizzi come descritto nel prospetto interno ovvero attenendosi alle istruzioni che ha ricevuto dal medico, farmacista o dal droghiere. Abbia cura di conservare il prospetto del medicamento, perché eventualmente lo vorrà leggere ancora in un secondo tempo.

Quando si usa SIMILASAN lattopoiesi ?

Secondo i principi farmacologici dell'omeopatia, SIMILASAN lattopoiesi trova impiego nei casi di:

- Scarsa produzione di latte e per favorire il flusso latteo

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Qualora siano stati prescritti altri medicinali da parte del medico curante, consultare il medico o il farmacista per sapere se è possibile assumere contemporaneamente anche SIMILASAN lattopoiesi.

Quando non si può assumere SIMILASAN lattopoiesi e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

- Fino ad oggi non si conoscono controindicazioni. Non sono necessarie precauzioni particolari, a condizione che il preparato sia usato correttamente.
- Informi il suo medico, farmacista o droghiere se:
 - soffre di altre malattie,
 - ha qualche allergia oppure,
 - prende altri medicinali (anche se acquistati di propria iniziativa).

Come usare SIMILASAN lattopoiesi ?

Salvo diversa prescrizione medica, attenersi alla seguente posologia:

Forte carenza di latte, flusso latteo molto scarso: 7 globuli 6 volte al giorno

Ottimizzazione e mantenimento della quantità di latte:
7 globuli 2-3 volte al giorno

Avvertenze per l'assunzione:

- Lasciar sciogliere i globuli in bocca.
- L'assunzione può avvenire anche a stomaco vuoto.

La durata dell'effetto varia a seconda del soggetto. In generale si consiglia di ripetere la somministrazione del preparato in caso di riduzione dell'effetto o di ripresa dei sintomi. Durata del trattamento: Se necessario, per tutto il periodo dell'allattamento.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico.

Se ritiene che il medicamento agisca troppo o troppo poco, ne parli al medico, al farmacista o al droghiere.

Quali effetti collaterali può avere SIMILASAN lattopoiesi ?

Non sono stati finora osservati effetti collaterali in seguito all'impiego corretto di SIMILASAN lattopoiesi.

Se comunque osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico, farmacista o droghiere.

L'assunzione di preparati umeopatici può dar luogo a una temporanea intensificazione dei sintomi (peggioramento iniziale).

Globuli**Cosa fare quando i sintomi si acutizzano:**

1. Interrompere la somministrazione fino a quando la reazione si affievolisce.
2. Prendere in una volta sola 7 globuli e aspettare l'effetto.
3. Se la reazione si ripete, comportarsi come descritto ai punti 1. e 2.
4. Se non si avverte più alcuna reazione, attenersi alle raccomandazioni descritte al paragrafo "Come si usa ...".

Qualora il peggioramento dovesse persistere, interrompere l'assunzione di SIMILASAN lattopoiesi e consultare il medico, il farmacista o il droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

- Senza zucchero. Con xilitolo.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Il preparato può essere somministrato solo fino alla data <Exp.> indicata sulla confezione.
- Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Ulteriori informazioni possono essere fornite dal medico, dal farmacista o dal droghiere.

Cosa contiene SIMILASAN lattopoiesi ?

Globuli contengono: Alfalfa D6 / Lac caninum D10 / Urtica urens D6 in parti uguali. Il preparato contiene come excipienti xilitolo e carbonato di calcio.

Numeri dell'omologazione:

54925 (Swissmedic)

Dov'è ottenibile SIMILASAN lattopoiesi ?**Quali confezioni sono disponibili?**

In farmacia e drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni: 15 g

4,5 g (solo come parte integrante della farmacia tascabile)

Titolare dell'autorizzazione:

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Questo foglio illustrativo è stato controllato per l'ultima volta nel febbraio 2009 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

Information for patients

Read this package leaflet carefully since it contains important information. This medicine has either been prescribed for you personally by your doctor, or you have purchased it from a pharmacist or druggist without a medical prescription. In order to obtain the greatest benefit from this medicine, use it according to this package leaflet or as directed by your doctor, pharmacist or druggist. Keep this package leaflet safe, you may want to read it again later.

When should SIMILASAN milk production be taken?

In accordance with homeopathic principles,

SIMILASAN milk production can be taken in cases of:

- Insufficient milk production by nursing mothers and to stimulate the milk flow

What precautions should be taken?

If your physician has prescribed other medications, please ask him/her or your pharmacist if you may take SIMILASAN milk production at the same time.

When must SIMILASAN milk production not be taken or taken only with caution?

- There are no known restrictions on use at present. When used as recommended, no particular precautionary measures are necessary.

• Tell your doctor, pharmacist or druggist if you:

- are suffering from any other diseases or illnesses,
- have allergies or
- are taking other medicines (even those you have bought yourself).

How do you take SIMILASAN milk production?

Unless prescribed differently by your physician:

In case of significant lack of milk or extremely weak milk flow:

7 globules 6 times daily

Globules**Should the worsening of symptoms persist, stop taking SIMILASAN milk production and inform your physician, pharmacist or druggist.****What should also be taken into consideration?**

- Sugar-free. With xylitol.

• Keep out of the reach of children.

• This preparation must not be used after the expiry date indicated as <Exp.> on the container.

• Store at room temperature (15-25 °C).

Further information can be obtained from your physician, pharmacist or druggist.

What does SIMILASAN milk production contain?

The globules contain: Alfalfa D6 / Lac caninum D10 / Urtica urens D6 in equal proportions.

The medication contains as excipients xylitol and calcium carbonate.

Product licence No.:

54925 (Swissmedic)

Where can you obtain SIMILASAN milk production? How is the preparation presented?

In pharmacies and drugstores, without medical prescription.

Package sizes: 15 g

4,5 g (only as part of the Pocket Medical Kit)

Holder of the product licence:

Similasan AG, CH-8916 Jonen

The latest examination of this package leaflet was carried out in February 2009 by the Federal Authorities for Medication (Swissmedic).