

**Nervöse Beschwerden****Information für Patientinnen und Patienten**

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen. Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten, oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäß Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogeries bzw. der Ärztin, Apothekerin oder Drogeristin an, um den größten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

**Wann wird SIMILASAN Nervöse Beschwerden angewendet?**

Gemäß homöopathischem Arzneimittelbild kann SIMILASAN Nervöse Beschwerden angewendet werden bei Beschwerden (in Zusammenhang mit bevorstehenden Ereignissen) wie:

- Examensangst, Lampenfieber
- Nervösem Durchfall, Magenschmerzen
- Unfähigkeit sich zu konzentrieren, Zerstreutheit
- Schwindelgefühl, Kopfweh
- Angstgefühl und unruhigem Schlaf (Träume)
- Innerer Gehetztheit, Herzschlägen, Zittern

**Was sollte dazu beachtet werden?**

- Bei Anhalten der Beschwerden über einen Monat soll ärztliche Hilfe beansprucht werden.
- Dieses Arzneimittel enthält 0,24 g verwertbare Kohlenhydrate pro Einzeldosis.
- Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob SIMILASAN Nervöse Beschwerden gleichzeitig eingenommen werden darf.

**Wann darf SIMILASAN Nervöse Beschwerden nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?**

- Bis heute sind keine Anwendungseinschränkungen bekannt. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmassnahmen notwendig.
- Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogerie bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogeristin, wenn Sie

- an andern Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte) einnehmen oder äußerlich anwenden!

**Wie verwenden Sie SIMILASAN Nervöse Beschwerden?**

Falls vom Arzt bzw. von der Ärztin nicht anders verschrieben:

Kinder und Erwachsene: 1 Tablette pro Gabe.  
 • Akute Beschwerden: Mehrmals täglich (bis stündlich), je nach Wirkungsdauer der eingenommenen Tablette.

• Chronische Beschwerden und zum Ausheilen: 3 x täglich 1 Tablette.

**Einnahmehinweise:**

- Tablette im Mund zergehen lassen (eventuell kauen) und mit der Zunge auf die umliegenden Schleimhäute verteilen.
- Darauf auch auf nüchternen Magen eingenommen werden.

Die Wirkungsdauer einer Arzneimittelgabe kann individuell verschieden sein. Grundsätzlich wird die Einnahme des Präparates bei Nachlassen der Wirkung oder bei Rückkehr der Beschwerden wiederholt.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung.

Wenn bei der Behandlung eines Kleinkindes/ Kindes die gewünschte Besserung nicht eintritt, ist mit ihm ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen. Wenn Sie glauben, dass Arzneimittel wirkt zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogerie bzw. Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogeristin.

**Welche Nebenwirkungen kann SIMILASAN Nervöse Beschwerden haben?**

Für SIMILASAN Nervöse Beschwerden sind bisher bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden. Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen beobachten, informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogerie bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogeristin.

Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung).

**Massnahmen bei anfänglicher Symptomverstärkung:**

1. Präparat nicht mehr einnehmen bis die Reaktion abgeklungen ist.
2. Einmal 1 Tablette einnehmen. Wirkung abwarten.
3. Bei Wiederholung der Reaktion gleiches Verhalten wie unter 1. und 2. beschrieben.
4. Wird keine Reaktion mehr verspürt, die Empfehlungen unter "Wie verwenden Sie ..." einhalten.

Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie SIMILASAN Nervöse Beschwerden ab und informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogerie bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogeristin.

**Was ist ferner zu beachten?**

- Vor Kindern geschützt aufbewahren.
- Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit <Exp.> bezeichneten Datum verwendet werden.
- Bei Raumtemperatur (15–25 °C) lagern.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogerie bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogeristin.

**Was ist in SIMILASAN Nervöse Beschwerden enthalten?**

1 Tablette enthält: Argentum nitricum D15 / Strophantus gratus D12 zu gleichen Teilen 12,5 mg. Hilfsstoffe: Milchzucker, Maisstärke und Magnesiumstearat.

**Zulassungsnummer:**  
48024 (Swissmedic)**Wo erhalten Sie SIMILASAN Nervöse Beschwerden? Welche Packungen sind erhältlich?**

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.  
 Packungsgröße: 60 Tabletten

**Zulassungsinhaberin und Herstellerin:**

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Diese Packungsbeilage wurde im März 2008 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

**Médicament homéopathique****Similasan****Comprimés****Nervosité****Information destinée aux patients**

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par le pharmacien ou le droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications du médecin, pharmacien ou droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

**Quand SIMILASAN nervosité est-il utilisé?**

Conformément au schéma thérapeutique homéopathique SIMILASAN nervosité peut être utilisé en cas de troubles (en rapport avec des événements à venir) tels que:

- Peur avant un examen, trac
- Diarrées nerveuses, maux d'estomac
- Manque de concentration, distraction et inattention
- Sensation de vertige, maux de tête
- Etats anxieux et sommeil agité (cauchemar)
- Agitation interne, palpitations, tremblement

**De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?**

- Si les troubles persistent plus d'un mois, vous devez consulter votre médecin.
- Ce médicament contient 0,24 g d'hydrates de carbone digestibles par dose simple.
- Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si SIMILASAN nervosité peut être pris simultanément.

**Quand SIMILASAN nervosité ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?**

- Aucune limitation d'emploi n'est connue à ce jour. Si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, aucune précaution particulière n'est requise.
- Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si
  - vous souffrez d'une autre maladie,
  - vous êtes allergique,
  - vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication).

**Comment utiliser SIMILASAN nervosité?**

Si votre médecin n'a pas fait une autre prescription:

Enfants et adultes: 1 comprimé par prise.

- Troubles aigus: Selon les besoins, un comprimé plusieurs fois par jour (voire toutes les heures).
- Troubles chroniques et pour parachever la guérison: 3 fois 1 comprimé par jour.

**Mode d'emploi:**

- Laisser fondre le comprimé dans la bouche (éventuellement mâcher) et bien le répartir avec la langue sur les muqueuses avoisinantes.
- Les comprimés peuvent être pris même si vous êtes à jeun.

Le temps d'action d'un médicament peut varier d'une personne à l'autre.

C'est pourquoi il est conseillé d'administrer une nouvelle prise lorsque l'effet de la préparation diminue ou lorsque les troubles reviennent.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin.

Si l'amélioration escomptée de l'enfant en bas âge / de l'enfant ne se produit pas, faites-le examiner par un médecin. Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou droguiste si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

**Quels effets secondaires SIMILASAN nervosité peut-il provoquer?**

Lors d'un emploi approprié, aucun effet secondaire indésirable n'a été constaté jusqu'à ce jour pour SIMILASAN nervosité.

Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Lors de la prise de médicaments homéopathiques, les troubles peuvent s'aggraver passagèrement (aggravation initiale).

**Measures en cas d'aggravation des symptômes au début du traitement:**

1. Suspender l'administration de la préparation jusqu'à ce que la réaction thérapeutique ait cessé.
  2. Prendre en une fois 1 comprimé.
- Attendre la réaction.

3. Si la réaction se répète, agir comme indiqué sous points 1. et 2.

4. Si vous ne ressentez aucune réaction, respectez les recommandations mentionnées sous "Comment utiliser ...".

Si l'aggravation persiste, cessez le traitement avec SIMILASAN nervosité et informez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

**A quoi faut-il encore faire attention?**

- Conserver hors de portée des enfants.
- Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date indiquée sur le récipient par la mention <Exp>.
- Conserver à température ambiante entre 15 et 25 °C.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

**Que contient SIMILASAN nervosité?**

1 comprimé contient: Argentum nitricum D15 / Strophantus gratus D12 à parts égales 12,5 mg. La préparation contient en tant qu'excipients: lactose, amidon de maïs et stéarate de magnésium.

**Numéro d'autorisation:**

48024 (Swissmedic)

**Où obtenez-vous SIMILASAN nervosité ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?**

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Conditionnement: 60 comprimés

**Titulaire de l'autorisation et fabricant:**

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Cette notice d'emballage a été contrôlée par l'autorité des médicaments (Swissmedic) en mars 2008.

**Disturbi nervosi****Informazione destinata ai pazienti**

Legga attentamente questo prospetto, perché contiene informazioni importanti. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente dal suo medico oppure è stato da lei acquistato in farmacia o drogheria senza ricetta medica. Per ottenere il massimo giovamento da questo preparato, lo utilizzi come descritto nel prospetto interno ovvero attenendosi alle istruzioni che ha ricevuto dal medico, farmacista o dal droghiere. Abbia cura di conservare il prospetto del medicamento, perché eventualmente lo vorrà leggere ancora in un secondo tempo.

**Quando si usa SIMILASAN disturbi nervosi ?**

Secondo i principi farmacologici dell'omeopatia, SIMILASAN disturbi nervosi trova impiego in disturbi (correlati ad eventi imminenti) come:

- Paura degli esami, agitazione
- Diarrea di origine nervosa, dolori di stomaco
- Incapacità di concentrazione, stato di distrazione
- Senso di vertigine, dolori di testa
- Stato d'ansia opprimente e sonno agitato (sogni)
- Agitazione interna, palpazioni, tremore

**Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?**

- Qualora i disturbi persistano oltre un mese è necessario ricorrere all'assistenza del medico.
- Questo medicamento contiene 0,24 g di carboidrati digeribili per singola dose.
- Qualora siano stati prescritti altri medicinali da parte del medico curante, consultare il medico o il farmacista per sapere se è possibile assumere contemporaneamente anche SIMILASAN disturbi nervosi.

**Quando non si può assumere SIMILASAN disturbi nervosi e quando la sua somministrazione richiede prudenza?**

- Fino ad oggi non si conoscono controindicazioni. Non sono necessarie precauzioni particolari, a condizione che il preparato sia usato correttamente.

- Informi il suo medico, farmacista o droghiere se
  - soffre di altre malattie,
  - ha qualche allergia oppure,
  - prende o applica esternamente (nel caso dei preparati esterni) altri medicamenti!

**Come usare SIMILASAN disturbi nervosi ?**

Salvo diversa prescrizione medica, attenersi alla seguente posologia:

Bambini e adulti: 1 pastiglia per ogni somministrazione.

- Fase acuta: A seconda della necessità, una pastiglia più volte al giorno (fino a ogni ora).
- Disturbi cronici e fino alla completa guarigione: 1 pastiglia 3 volte al giorno.

**Modalità di assunzione:**

- Far sciolgere la pastiglia in bocca (eventualmente mastichandola) e distribuirla con la lingua sulle mucose della bocca.
- Può essere somministrato anche a stomaco vuoto.

La durata dell'effetto varia a seconda del soggetto.

In generale si consiglia di ripetere la somministrazione del preparato in caso di riduzione dell'effetto o di ripresa dei sintomi. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico.

Se il trattamento riguarda un bambino e non si ottiene il miglioramento desiderato, il bambino deve essere visitato da un medico.

Se ritiene che il medicamento agisca troppo o troppo poco, ne parli al medico, al farmacista o al droghiere.

**Quali effetti collaterali può avere SIMILASAN disturbi nervosi ?**

Non sono stati finora osservati effetti collaterali in seguito all'impiego corretto di SIMILASAN disturbi nervosi. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico, farmacista o droghiere.

L'assunzione di preparati omeopatici può dar luogo a una temporanea intensificazione dei sintomi (peggioreimento iniziale).

**Cosa fare quando i sintomi si acutizzano:**

1. Interrompere la somministrazione fino a quando la reazione si affievolisce.
2. Prendere in una volta 1 pastiglia e aspettare l'effetto.
3. Se la reazione si ripete, comportarsi come descritto ai punti 1. e 2.
4. Se non si avverte più alcuna reazione, attenersi alle raccomandazioni descritte al paragrafo "Come si usa...".

Qualora il peggioramento dovesse persistere, interrompere l'assunzione di SIMILASAN disturbi nervosi e consultare il medico, il farmacista o il droghiere.

**Di che altro occorre tener conto?**

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Il preparato può essere somministrato solo fino alla data <Exp.> indicata sulla confezione.
- Conservare a temperatura ambiente (15–25 °C).

Ulteriori informazioni possono essere fornite dal medico, dal farmacista o dal droghiere.

**Cosa contiene SIMILASAN disturbi nervosi ?**

1 pastiglia contiene: Argentum nitricum D15 / Strophantus gratus D12 in parti uguali 12,5 mg.

Il preparato contiene come excipienti: Lattosio, amido di mais e stearato di magnesio.

**Numero dell'omologazione:**

48024 (Swissmedic)

**Dov'è ottenibile SIMILASAN disturbi nervosi ? Quali confezioni sono disponibili?**

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezione: 60 pastiglie

**Titolare dell'autorizzazione e produttore:**

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Questo foglio illustrativo è stato controllato per l'ultima volta nel marzo 2008 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

**Nervous complaints****Information for patients**

Read this package leaflet carefully since it contains important information. This medicine has either been prescribed for you personally by your doctor, or you have purchased it from a pharmacist or druggist without a medical prescription. In order to obtain the greatest benefit from this medicine, use it according to this package leaflet or as directed by your doctor, pharmacist or druggist. Keep this package leaflet safe, you may want to read it again later.

**When should SIMILASAN nervous complaints be taken?**

In accordance with homeopathic principles, SIMILASAN nervous complaints (in connection with forthcoming events) can be taken in incidences of:

- Anxiety before examinations, stage fright
- Nervous diarrhea, abdominal pain
- Lack of concentration, absentmindedness
- Dizzy feeling, headache
- Oppressive anxiety and restless insomnia (nightmares)
- Sense of stress, palpitations, tremors

**What precautions should be taken?**

- Medical treatment should be sought if symptoms persist for more than a month.
- This medicine contains 0,24 g digestible carbohydrates per single dose.
- If your physician has prescribed other medications, please ask him/her or your pharmacist if you may take SIMILASAN nervous complaints at the same time.

**When must SIMILASAN nervous complaints not be taken or taken only with caution?**

- There are no known restrictions on use at present. When used as recommended, no particular precautionary measures are necessary.
- Tell your doctor, pharmacist or druggist if you:
  - are suffering from any other diseases or illnesses,

**Tablets****Measures to take in the case of initial worsening of symptoms:**

1. Stop taking the preparation until the reaction has ceased.
2. Take a single dose of 1 tablet and wait for the reaction.
3. If the reaction recurs, proceed as described in 1. and 2. above.
4. If the reaction does not recur, follow the instructions mentioned in "How do you take ...".

Should the worsening of symptoms continue, stop taking SIMILASAN nervous complaints and inform your physician, pharmacist or druggist.

**What should also be taken into consideration?**

- Keep out of the reach of children.
- The medication may only be taken until the expiry date marked <Exp.> on the container.
- Store at room temperature (15–25 °C).

Further information can be obtained from your physician, pharmacist or druggist.

**What does SIMILASAN nervous complaints contain?**

1 tablet contains: Argentum nitricum D15 / Strophantus gratus D12 in equal proportions 12,5 mg. The medication contains as excipients: lactose, corn starch and magnesium stearate.

**Product licence No.:**

48024 (Swissmedic)

**Where can you obtain SIMILASAN nervous complaints ? How is the preparation presented?**

In pharmacies and drugstores, without medical prescription.

Package size: 60 tablets

**Holder of the product licence and manufacturer:**

Similasan AG, CH-8916 Jonen

The latest examination of this package leaflet was carried out in March 2008 by the Federal Authorities for Medication (Swissmedic).